Zöliakie-Diagnostik nach den aktuellen ESPGHAN-Kriterien

(nach Husby et al., J Paediatr Gastroenterol Nutr 2011)



[1]Oder Zöliakie-spezifische IgG-basierte Tests, z.B. Anti-DGP (IgG), Anti-tTG (IgG) oder EmA (IgG); [2]Upper limit of normal; [3]EMA oder DQ2/DQ8; [4]Aus zweiter Blutprobe, als zusätzliche Kontrolle; [5]Unklarer Befund, falsch positives Anti-tTG-Ergebnis?, falsch negativer HLA-Test?, Biopsie in Erwägung ziehen; [6]Falsch negatives bioptisches oder falsch positives serologisches Ergebnis?; [7]Glutenfreie Diät



[1]Oder Zöliakie-spezifische IgG-basierte Tests, z.B. Anti-DGP (IgG), Anti-tTG (IgG) oder EmA (IgG); [2]Upper limit of normal; [3]Aus Bulbus duodeni u. 4x aus Pars descendens; [4]Unklarer Befund, falsch negatives bioptisches oder falsch positives serologisches Ergebnis?, silente/latente Zöliakie?; [5]Glutenfreie Diät

© Copyright
Prof. Gisela Enders
Stuttgart, 2013