LABOR ENDERS

ÜBERSICHT ABNAHMEGEFÄßE

Stand 11/2026

SERUM-GEL



Monovette 30 min. senkrecht gerinnen, danach **zentrifugieren.**

Bei Serum-Monovetten **ohne Gel**: Probe zentrifugieren, Serumüberstand in Neutralröhrchen überführen.

EDTA 2,7 ML



Blutbild, HbA1c, BSG, PCR.

Für Genetische Untersuchungen: Monovette komplett **beschriften** (Name, Vorname, Geburtsdatum).

Lagerung bei RT.

Citrat-Monovette



Gerinnungsanalysen.

Bitte komplett befüllen (Fülllinie).

EDTA/-Citrat- PLASMA



Gewinnung von **EDTA- / Citrat**:

EDTA-/ oder Citrat-Monovette zentrifugieren, Plasmaüberstand in Neutralröhrchen abpipettieren , beschriften, tiefgefroren versenden/lagern.

HEPARIN



T-SPOT.TB, ELISPOT, Granulozyten-funktion.

Versand binnen 24 h bei RT.

EDTA 7,5 ML



Blutgruppe, Antikörpersuchtest, Fetaler Rhesusfaktor.

Immer mit Name, Vorname, Geb.-Dat. **beschriften.** Für Fetalen Rhesusfaktor separate Monovette einsenden.

THROMBOEXACT



Nur Messung der Thrombozyten bei V.a. EDTA induzierte Pseudo-thrombozytopenie.

Bei RT lagern.

STERILES/NEUTRALES RÖHRCHEN

Serum/Plasma (gefroren), Punktat, Liquor, Haare, Fruchtwasser. Bei Biopsaten + ca. 1ml NaCl 0,9%. Kein Formalin!

Material bitte auf Röhrchen vermerken.

GLUCOEXACT



Glucose, OGT.

Bitte komplett befüllen (Fülllinie).

Lagerung ca. 48 h bei RT.

IDK / IFOBT



Blut im Stuhl, Calprotectin, Lactoferrin, Pankreaselastase.

Stabilität für Blut im Stuhl: 5 Tage RT/ 7 Tage gekühlt

Nicht für Mikrobiologie verwenden.

Fahrdienst/Versand: 0711/6357-104 **IT-Support:** 0711/6357-231 **Außendienst:** 0711/6357-199/-189 **Nachforderung per Fax**: 0711/6357-196

LABOR ENDERS

ÜBERSICHT ABNAHMEGEFÄßE

Stand 11/2026

THARMAC GYNOPREP
HPV Screening/Typisierung



Bürste im Medium gut auswaschen und **NICHT** im Medium belassen!

URIN-MONOVETTE
Ohne Stabilisator



Urindiagnostik,
Virusnachweis
(z.B. CMV).

Für Keime/Pilze
Borat-Urin verwenden.

ABSTRICH COBAS
STI Screening (PCR)
Respiratorische Erreger (PCR)



STI: u.a. Chlamydien,
Gonokokken.
Corona, RSV, Influenza.
Abstrichtupfer belassen
und abbrechen.

Lagerung: RT/Kühlschrank

URIN COBAS
Urin-PCR Diagnostik



Erststrahl Urin mit
Pipette in Röhrchen
überführen.
Danach 5x mischen.

Lagerung: RT/Kühlschrank

VIRUSNACHWEIS
Herpes genitalis



Abstrich zum
Virusnachweis bei
Herpes genitalis.


ABSTRICH TROCKEN



Trocken versenden oder in
Virustransportmedium einbringen
(rote Kappe). **KEIN GEL!**

Dicker Abstrich: Wunden, Gyn
Dünner Abstrich: Kinder, Urethral

ABSTRICH mit GEL



Abstriche **MIT GEL**
zur Bakterienkultur
(aerob/anaerob) &
transportempfindliche
Erreger.

Lagerung: RT/
Kühlschrank.

STUHLRÖHRCHEN



Mikrobiologie:
Bakterien, Viren,
Würmer, Protozoen,
C. Diff.,
Helicobacter-Antigen.
Lagerung:
Kühlschrank.

URIN BORAT



Bakterien/Pilze aus Urin.
Mit Borat-Stabilisator.
Komplett befüllen
(Fülllinie)!

Transport < 48h bei RT.

URICULT / URINAX
Eintauchnährboden



In separatem Gefäß in Urin
eintauchen, abtropfen,
Gefäß ohne Restflüssigkeit
fest verschrauben.
Indikation:
Nur bei Transport > 48 h
oder ohne Borat-Option.

BLUTKULTUREN
Aerob / Anaerob



Allg. Erreger,
je 10 ml pro
Flasche.
Nicht vorbebrüten!

Lagerung bei RT.

SPUTUMBECHER
Sputum / Urin



Sputum für allg.
Bakteriologie,
Mykobakterien-
PCR & Kultur.

Urin:
Nur für Tbc-Diagnostik.

Fahrdienst/Versand: 0711/6357-104 **IT-Support:** 0711/6357-231 **Außendienst:** 0711/6357-199/-189 **Nachforderung per Fax**: 0711/6357-196